
Esiti del trattamento residenziale di Villa Garda per i disturbi dell'alimentazione


**Pazienti consecutivi dimessi negli anni
2015, 2016 e 2017**

Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso (IMC < 18,5 kg/m²)

- Anno 2017, n=76
- Anno 2016, n=69
- Anno 2015, n=64


Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso

Body Mass Index




Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso

Brief Symptom Inventory (BSI)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso

Clinical Impairment Assessment (CIA)




Percentuale di pazienti che hanno interrotto il trattamento

2015




■ Completers ■ Drop-out

2016



■ Completers ■ Drop-out

2017



■ Completers ■ Drop-out

Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso


- **Anno 2017:** tra i 66 completers, a fine terapia 57 pazienti (86,4%), raggiungono una condizione di normopeso (BMI $\geq 18,5$ kg/m²).
- **Anno 2016:** tra i 59 completers, a fine terapia 52 pazienti (88,1%), raggiungono una condizione di normopeso (BMI $\geq 18,5$ kg/m²).
- **Anno 2015:** tra i 57 completers, a fine terapia 54 pazienti (94,7%), raggiungono una condizione di normopeso (BMI $\geq 18,5$ kg/m²).

Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso maggiorenni

- Anno 2017, n=54
- Anno 2016, n=46
- Anno 2015, n=44


Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso maggiorenni

Body Mass Index




Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso maggiorenni

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso maggiorenni

Brief Symptom Inventory (BSI)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso maggiorenni

Clinical Impairment Assessment (CIA)




Percentuale di pazienti sottopeso che hanno interrotto il trattamento

2015




■ Completers ■ Drop-out

2016



■ Completers ■ Drop-out

2017



■ Completers ■ Drop-out

Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso maggiorenni


- **Anno 2017:** tra i 46 completers, a fine terapia 39 pazienti (84,8%), raggiungono una condizione di normopeso (BMI $\geq 18,5$ kg/m²).
- **Anno 2016:** tra i 38 completers, a fine terapia 34 pazienti (89,5%), raggiungono una condizione di normopeso (BMI $\geq 18,5$ kg/m²).
- **Anno 2015:** tra i 41 completers, a fine terapia 37 pazienti (90,2%), raggiungono una condizione di normopeso (BMI $\geq 18,5$ kg/m²).

Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso minorenni

- Anno 2017, n=22
- Anno 2016, n=20
- Anno 2015, n=23


Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso minorenni

Percentile di Body Mass Index




Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso minorenni

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso minorenni

Brief Symptom Inventory (BSI)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso minorenni

Clinical Impairment Assessment (CIA)




Percentuale di pazienti che hanno interrotto il trattamento

2015




■ Completers ■ Drop-out

2016



■ Completers ■ Drop-out

2017



■ Completers ■ Drop-out

Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso minorenni


- **Anno 2017:** tra i 20 completers, a fine terapia 15 pazienti (75%), raggiungono una condizione di normopeso (BMI $\geq 18,5$ kg/m²).
- **Anno 2016:** tra i 21 completers, a fine terapia 18 pazienti (85,7%), raggiungono una condizione di normopeso (BMI $\geq 18,5$ kg/m²).
- **Anno 2015:** tra i 16 completers, a fine terapia 13 pazienti (81,3%), raggiungono una condizione di normopeso (BMI $\geq 18,5$ kg/m²).

Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso (IMC $\geq 18,5$ kg/m²)

- Anno 2017, n=13
- Anno 2016, n=19
- Anno 2015, n=30


Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso

Body Mass Index




Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso

Brief Symptom Inventory (BSI)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso

Clinical Impairment Assessment (CIA)




Percentuale di pazienti che hanno interrotto il trattamento

2015




■ Completers ■ Drop-out

2016



■ Completers ■ Drop-out

2017




■ Completers ■ Drop-out

Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso maggiorenni


- Anno 2017, n=11
- Anno 2016, n=19
- Anno 2015, n=23

Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso maggiorenni




Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso maggiorenni

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso maggiorenni

Brief Symptom Inventory (BSI)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso maggiorenni

Clinical Impairment Assessment (CIA)




Percentuale di pazienti che hanno interrotto il trattamento

2015




■ Completers ■ Drop-out

2016



■ Completers ■ Drop-out

2017




■ Completers ■ Drop-out

Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso minorenni

- Anno 2017, n=2
- Anno 2016, n=1
- Anno 2015, n=7


Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso minorenni

Percentile di Body Mass Index




Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso minorenni

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso minorenni

Brief Symptom Inventory (BSI)



Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso minorenni

Clinical Impairment Assessment (CIA)



Percentuale di pazienti che hanno interrotto il trattamento

- Anno 2015: 1 paziente su 7 (14.3%) ha interrotto il trattamento