

Pazienti consecutivi ricoverati dall'ottobre 2018 e dimessi nel dicembre 2019 presso la Casa di Cura Villa Garda

Responsabile Dr. Riccardo Dalle Grave

Pazienti affetti da disturbi dell'alimentazione

RICOVERATI SOTTOPESO (BMI < 18,5 kg/m²)

N° pazienti: 61

Indicatore	Entrata	Dimissione	P	Anno 2019 (n=61)		Anno 2018 (n=70)		Anno 2017 (n=76)		Anno 2016 (n=69)		Anno 2015 (n=64)	
				% var	<i>d</i>	% var	<i>d</i>	% var	<i>D</i>	% var	<i>d</i>	% var	<i>d</i>
BMI	14,4 (2,3)	19,5 (1,2)	<0,001	39,1	2,57	34,7	1,94	33,9	2,13	34,7	3,33	34,0	2,54
Totale EDEQ	4,1 (1,3)	1,9 (1,1)	<0,001	51,7	1,68	55,4	1,65	56,6	1,91	55,6	1,83	47,5	1,67
BSI	2,2 (0,8)	1,0 (0,7)	<0,001	53,2	1,38	55,1	1,46	56,1	1,55	22,6	1,22	25,9	1,42
CIA	36,1 (10,5)	15,9 (11,0)	<0,001	56,0	1,79	70,0	1,75	57,4	1,57	56,7	2,00	52,6	1,96

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment

% var = percentuale media di variazione

d = effect size

Nel 2019: A fine terapia 50 pazienti (92,6%) su 54 che avevano il BMI basale inferiore a 18,5 kg/m², raggiungono una condizione di normopeso (BMI ≥18,5 kg/m²). Drop-out: n=7 (11,5%)

Nel 2018: A fine terapia 56 pazienti (88,9%) su 63 che avevano il BMI basale inferiore a 18,5 kg/m², raggiungono una condizione di normopeso (BMI ≥18,5 kg/m²). Drop-out: n=7 (10%)

Nel 2017: A fine terapia 57 pazienti (86,4%) su 66 che avevano il BMI basale inferiore a 18,5 kg/m², raggiungono una condizione di normopeso (BMI ≥18,5 kg/m²). Drop-out: n=10 (13,2%)

Nel 2016: A fine terapia 52 pazienti (88,1%) su 59 che avevano il BMI basale inferiore a 18,5 kg/m², raggiungono una condizione di normopeso (BMI ≥18,5 kg/m²). Drop-out: n=10 (14,5%)

Nel 2015: A fine terapia 54 pazienti (94,7%) su 57 che avevano il BMI basale inferiore a 18,5 kg/m², raggiungono una condizione di normopeso (BMI ≥18,5 kg/m²). Drop-out: n=7 (10,9%)

Ricoverati sottopeso maggiorenni (BMI < 18,5 kg/m² e età ≥ 18)

N° pazienti: 41

Indicatore	Entrata	Dimissione	P	% media di variazione	% media di variazione prevista
BMI	14,0 (2,4)	19,4 (1,4)	<0,001	42,3	
Totale EDEQ	4,0 (1,3)	1,8 (1,1)	<0,001	56,5	20
BSI	2,1 (0,8)	0,8 (0,6)	<0,001	60,7	20
CIA	36,5 (11,5)	14,3 (10,6)	<0,001	60,1	20

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment

A fine terapia 32 pazienti (88,9%) su 36 che avevano il BMI basale inferiore a 18,5 kg/m² e sono maggiorenni, raggiungono una condizione di normopeso (BMI ≥18,5 kg/m²). Cinque pazienti hanno interrotto il trattamento (12,2%).

Ricoverati sottopeso minorenni (BMI < 18,5 kg/m² e età < 18)

N° pazienti: 20

Indicatore	Entrata	Dimissione	P	% media di variazione	% media di variazione prevista
Percentile di BMI	3,6 (5,6)	40,7 (11,3)	<0,001		
Totale EDEQ	4,2 (1,1)	2,3 (1,2)	<0,001	41,4	20
BSI	2,3 (0,8)	1,4 (0,9)	0,002	38,6	20
CIA	35,4 (8,2)	19,0 (11,5)	<0,001	48,0	20

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment

A fine il percentile di BMI nei 18 pazienti che hanno completato il trattamento oscilla tra 20,0 e 61,7. Due pazienti hanno interrotto il trattamento (10,0%).

RICOVERATI NON SOTTOPESO (BMI $\geq 18,5$ kg/m²)

N° pazienti: 22

Indicatore	Entrata	Dimissione	P	Anno 2019 (n=22)		Anno 2018 (n=9)		Anno 2017 (n=13)		Anno 2016 (n=19)		Anno 2015 (n=30)	
				% var	<i>d</i>	% var	<i>d</i>	% var	<i>d</i>	% var	<i>d</i>	% var	<i>d</i>
BMI	22,8 (3,6)	23,1 (3,0)	0,798	1,2	0,06	6,0	0,56	3,7	0,29	1,4	0,15	3,9	0,20
Totale EDEQ	4,6 (1,2)	2,0 (1,6)	<0,001	55,9	1,54	50,6	1,63	51,8	1,69	54,6	1,62	32,5	1,40
BSI	2,5 (0,8)	1,1 (0,9)	<0,001	56,6	1,51	52,9	1,52	36,3	0,96	25,0	1,32	17,1	0,76
CIA	39,3 (7,5)	17,7 (13,6)	<0,001	54,4	1,44	51,7	1,24	55,3	1,32	59,3	1,63	41,7	1,02

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment

% var = percentuale media di variazione

d = effect size

Drop-out 2019: n=5 (22,7%)

Drop-out 2018: n=2 (22,2%)

Drop-out 2017: n=1 (7,7%)

Drop-out 2016: n=2 (10,5%)

Drop-out 2015: n=2 (6,7%)

Ricoverati non sottopeso maggiorenni (BMI $\geq 18,5$ kg/m² e età ≥ 18)

N° pazienti: 16

Indicatore	Entrata	Dimissione	P	% media di variazione	% media di variazione prevista
BMI	22,4 (3,7)	22,6 (2,9)	0,899	1,3	
Totale EDEQ	4,6 (1,3)	2,1 (1,8)	<0,001	55,6	20
BSI	2,5 (0,9)	1,2 (0,9)	0,001	51,2	20
CIA	39,7 (8,1)	19,6 (15,1)	0,001	50,4	20

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment

Drop-out: n=3 (18,8%)

Ricoverati non sottopeso minorenni (BMI $\geq 18,5$ kg/m² e età < 18)

N° pazienti: 6

Indicatore	Entrata	Dimissione	P	% di variazione	% media di variazione prevista
Percentile di BMI	63,1	81,7	0,459		
Totale EDEQ	4,6 (1,2)	1,6 (0,4)	0,040	56,8	20
BSI	2,4 (0,6)	0,6 (0,5)	0,003	74,3	20
CIA	38,0 (6,1)	11,5 (3,1)	0,010	67,4	20

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment

Drop-out: n=2 (33,3%)