

**Pazienti consecutivi dimessi nel 2017  
presso la Casa di Cura Villa Garda**

Garda, 31 Dicembre 2017

**Pazienti affetti da disturbi dell'alimentazione**

**RICOVERATI SOTTO PESO (BMI < 18,5 kg/m<sup>2</sup>)**

N° pazienti: 76

Indicatore	Entrata	Dimissione	P	Anno 2017 (n=76)		Anno 2016 (n=69)		Anno 2015 (n=64)	
				% var	<i>D</i>	% var	<i>d</i>	% var	<i>d</i>
BMI	15,0 (1,9)	19,8 (1,5)	<0,001	33,9	2,13	34,7	3,33	34,0	2,54
Totale EDEQ	4,0 (1,4)	1,7 (1,1)	<0,001	56,6	1,91	55,6	1,83	47,5	1,67
BSI	2,2 (0,8)	1,0 (0,8)	<0,001	56,1	1,55	22,6	1,22	25,9	1,42
CIA	35,3 (10,6)	15,1 (13,6)	<0,001	57,4	1,57	56,7	2,00	52,6	1,96

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment

% var = percentuale media di variazione

*d* = effect size

Nel 2017: A fine terapia 57 pazienti (86,4%) su 66 che hanno il BMI basale inferiore a 18,5 kg/m<sup>2</sup>, raggiungono una condizione di normopeso (BMI ≥18,5 kg/m<sup>2</sup>). Drop-out: n=10 (13,2%)

Nel 2016: A fine terapia 52 pazienti (88,1%) su 59 che hanno il BMI basale inferiore a 18,5 kg/m<sup>2</sup>, raggiungono una condizione di normopeso (BMI ≥18,5 kg/m<sup>2</sup>). Drop-out: n=10 (14,5%)

Nel 2015: A fine terapia 54 pazienti (94,7%) su 57 che hanno il BMI basale inferiore a 18,5 kg/m<sup>2</sup>, raggiungono una condizione di normopeso (BMI ≥18,5 kg/m<sup>2</sup>). Drop-out: n=7 (10,9%)

#### **Ricoverati sottopeso maggiorenni (BMI < 18,5 kg/m<sup>2</sup> e età ≥ 18)**

N° pazienti: 54

Indicatore	Entrata	Dimissione	P	% media di variazione	% media di variazione prevista
BMI	15,2 (2,1)	19,8 (1,3)	<0,001	31,7	
Totale EDEQ	4.1 (1,3)	1,7 (1,2)	<0,001	56,9	20
BSI	2,3 (0,8)	1,0 (0,8)	<0,001	54,4	20
CIA	37,2 (8,5)	15,8 (13,8)	<0,001	58,6	20

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment

A fine terapia 39 pazienti (84,8%) su 46 che hanno il BMI basale inferiore a 18,5 kg/m<sup>2</sup> e sono maggiorenni, raggiungono una condizione di normopeso (BMI ≥18,5 kg/m<sup>2</sup>). 8 pazienti hanno interrotto il trattamento (14,8%).

**Ricoverati sottopeso minorenni (BMI < 18,5 kg/m<sup>2</sup> e età < 18)**

N° pazienti: 22

Indicatore	Entrata	Dimissione	P	% media di variazione	% media di variazione prevista
Percentile di BMI	1,1 (2,0)	38,2 (20,7)	<0.001		
Totale EDEQ	3,8 (1,6)	1,5 (1,0)	<0.001	55,8	20
BSI	2,0 (0,9)	0,9 (0,7)	<0.001	60,1	20
CIA	30,5 (13,5)	13,7 (13,2)	<0.001	54,8	20

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment

A fine terapia 15 pazienti (75%) su 20 che hanno il BMI basale inferiore a 18,5 kg/m<sup>2</sup> e sono minorenni, raggiungono un percentile di BMI ≥ 18,5 kg/m<sup>2</sup>. 2 pazienti hanno interrotto il trattamento (9,1%).

## RICOVERATI NON SOTTOPESO (BMI $\geq 18,5$ kg/m<sup>2</sup>)

N° pazienti: 13

Indicatore	Entrata	Dimissione	P	Anno 2017 (n=13)		Anno 2016 (n=19)		Anno 2015 (n=30)	
				% var	<i>d</i>	% var	<i>d</i>	% var	<i>d</i>
BMI	23,3 (4,1)	23,8 (3,8)	0.355	3,7	0,29	1,4	0,15	3,9	0,20
Totale EDEQ	4,5 (1,2)	2,3 (1,4)	0.001	51,8	1,69	54,6	1,62	32,5	1,40
BSI	2,2 (0,7)	1,3 (0,7)	0,008	36,3	0,96	25,0	1,32	17,1	0,76
CIA	34,1 (9,2)	14,6 (11,9)	0,001	55,3	1,32	59,3	1,63	41,7	1,02

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment

% var = percentuale media di variazione

*d* = effect size

Drop-out 2017: n=1 (7,7%)

Drop-out 2016: n=2 (10,5%)

Drop-out 2015: n=2 (6,7%)

**Ricoverati non sottopeso maggiorenni (BMI  $\geq$  18,5 kg/m<sup>2</sup> e età  $\geq$  18)**

N° pazienti: 11

Indicatore	Entrata	Dimissione	P	% media di variazione	% media di variazione prevista
BMI	23,2 (4,4)	24,3 (4,0)	0.100	6,0	
Totale EDEQ	4,4 (1,2)	2,4 (1,5)	0,001	49,0	20
BSI	2,0 (0,7)	1,4 (0,8)	0,014	30,5	20
CIA	32,7 (8,9)	16,2 (12,4)	0,005	49,8	20

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment

Drop-out: n=1 (9,1%)

**Ricoverati non sottopeso minorenni (BMI  $\geq$  18,5 kg/m<sup>2</sup> e età < 18)**

N° pazienti: 2

Indicatore	Entrata	Dimissione	% di variazione	% media di variazione prevista
Percentile di BMI	73,2 (22,5)	60,2 (0,4)		
Totale EDEQ	5,3 (0,5)	1,8 (0,7)	65,5	20
BSI	3,0 (0,5)	1,0 (0,6)	65,6	20
CIA	41,5 (9,2)	6,5 (4,9)	82,6	20

I valori in parentesi sono deviazioni standard

BMI = Indice di Massa Corporea (peso in kg diviso altezza in metri al quadrato)

BSI = Brief Symptoms Inventory

CIA = Clinical Impairment Assessment